

RAZZA PINZGAUER al 31/12/2023

(1224 rilievi totali: 792 rilievi in fase 1 e 432 in fase 2, ancora in svolgimento)

Tabella 1. Ripartizione dei soggetti relativamente ai caratteri di colore del mantello, distribuzione del mantello e portamento delle corna.

Colore mantello	N°	%	Mantello distrib.	N°	%	Corna	N°	%
Bianco	35	2.9%	Intero	19	1.6%	Assenti	517	42.2%
Grigio	0	0.0%	Pezzato	18	1.5%	Portate in alto	227	18.5%
Nero	6	0.5%	Spruzzato	15	1.2%	Portate in avanti	183	15.0%
Bruno Chiaro	2	0.2%	Striscia Dorsale	1172	95.8%	Rivolte in basso	35	2.9%
Bruno Scuro	5	0.4%				Decornato	262	21.4%
Castano	0	0.0%						
Fromentino	1	0.1%						
Rosso	33	2.7%						
Rosso Mogano	1142	93.3%						

Tabella 2. Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica.

Rilevamento	N°	Media	Ds	Min.	Max.
Altezza al sacro (cm)	1224	141.7	5.5	120	170
Profondità Addominale (cm)	1224	87.5	5.2	70	101
Lunghezza Tronco (cm)	1224	92.3	5.9	75	110
Lunghezza Groppa (cm)	1224	54.4	3.1	45	68
Larghezza Groppa Bis-iliaca (cm)	1224	55.5	3.9	45	70
Larghezza Groppa Bis-ischiatica (cm)	1224	21.2	4.3	13	40
Inclinazione Groppa (punti)	1224	4.8	1.3	1	9
Profondità Mammella (cm)	1224	13.7	8.4	-20	35
Lunghezza Capezzoli Anteriori (cm)	1224	6.2	1.8	1	15
BCS (punti)	1224	3.3	0.5	1	5
Muscolosità Anteriore (punti)	1224	3.6	1.2	1	8
Muscolosità Posteriore (punti)	1224	4.1	1.2	1	8

Tabella 3. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti alla struttura degli animali.

Difetto	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Dorso Insellato	1056	86.3%	133	10.9%	35	2.9%
Dorso Arcuato	1114	91.0%	102	8.3%	8	0.7%
Spalle Deboli	1020	83.3%	164	13.4%	40	3.3%
Garretti serrati posteriormente	1060	86.6%	127	10.4%	37	3.0%
Unghia Aperta	1193	97.5%	27	2.2%	4	0.3%

Tabella 4. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti alla mammella.

Difetto	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Capezzoli a imbuto	1124	91.8%	80	6.5%	20	1.6%
Capezzoli non perpendicolari	1171	95.7%	43	3.5%	10	0.8%
Capezzoli Soprannumerari	1152	94.1%	60	4.9%	12	1.0%
Mammella spaccata tra i quarti	1115	91.1%	96	7.8%	13	1.1%
Piano inclinato	1104	90.2%	92	7.5%	28	2.3%

Tabella 5. Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento verso conspecifici, mungitura e operatori.

Temperamento	Non osservabile		Tranquillo		Nervoso	
	N°	%	N°	%	N°	%
Verso gli altri animali	1191	97.3%	31	2.5%	2	0.2%
Durante la mungitura	826	67.5%	316	25.8%	82	6.7%
Verso l'uomo	1184	96.7%	37	3.0%	3	0.2%