



## **EREDITABILITÀ DEI NUOVI FENOTIPI RILEVATI NELLA RAZZA PINZGAUER NELL'AMBITO DEL PSRN (PROGRAMMA DUALBREEDING STEP 2 FASE 2)**

Dataset contenente 958 rilievi utili e 3810 animali nel pedigree.

CARATTERE	Varianza Genetica	Varianza Fenotipica	Ereditabilità
Altezza al sacro	7.39	17.95	0.292
Profondità Addominale	3.87	16.51	0.190
Lunghezza Tronco	4.17	19.95	0.173
Lunghezza Groppa	0.24	6.62	0.036
Larghezza Groppa Bis-Iliaca	1.88	7.79	0.195
Larghezza Groppa Bis-Ischiatica	0.73	5.40	0.120
Inclinazione Groppa	0.21	1.21	0.151
Profondità Mammaria	13.01	24.92	0.343
Lunghezza Capezzoli Anteriori	1.09	1.67	0.395
BCS	10.64	59.95	0.151
Muscolosità Anteriore	0.25	0.67	0.275
Muscolosità Posteriore	0.37	0.72	0.338

*Dati elaborati a cura del Prof. Roberto Mantovani  
Department of Agronomy, Food, Natural Resources, Animal and Environment (DAFNAE)  
Università di Padova - ITALIA*