



## **EREDITABILITÀ DEI NUOVI FENOTIPI RILEVATI NELLA RAZZA PUSTERTALER SPRINZEN/BARÀ NELL'AMBITO DEL PSRN (PROGRAMMA DUALBREEDING STEP 2 FASE 2)**

Dataset contenente 966 rilievi utili e 2810 animali nel pedigree.

CARATTERE	Varianza Genetica	Varianza Fenotipica	Ereditabilità
Altezza al sacro	0.33	12.72	0.026
Profondità Addominale	3.08	12.56	0.197
Lunghezza Tronco	1.29	11.99	0.097
Lunghezza Groppa	0.63	4.87	0.115
Larghezza Groppa Bis-Iliaca	1.19	5.70	0.173
Larghezza Groppa Bis-Ischiatica	0.51	2.00	0.201
Inclinazione Groppa	0.00001	0.67380	0.00002
Profondità Mammaria	3.79	19.10	0.165
Lunghezza Capezzoli Anteriori	0.47	3.30	0.125
BCS	0.01	0.16	0.067
Muscolosità Anteriore	0.11	0.54	0.167
Muscolosità Posteriore	0.11	0.58	0.161

*Dati elaborati a cura del Prof. Roberto Mantovani  
Department of Agronomy, Food, Natural Resources, Animal and Environment (DAFNAE)  
Università di Padova - ITALIA*