

**STATISTICHE DESCRITTIVE INERENTI I NUOVI FENOTIPI RILEVATI IN SOGGETTI DI RAZZA
PUSTERTALER SPRINTZEN/BARÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO PSRN – DATI TRIENNIO AL
31/12/2019**




Misure Somatiche e Biometriche

CARATTERE	RILIEVI	MEDIA	DEV.ST	MIN	MAX
Altezza al sacro (cm)	567	140.6	5.7	121	154
Profondità addominale (cm)	567	79.9	6.9	60	106
Lunghezza tronco (cm)	567	85.2	6.9	70	113
Lunghezza groppa (cm)	567	48.6	5.3	38	62
Larghezza groppa bisiliaca (cm)	567	49.9	7	35	75
Larghezza groppa bisischiatica (cm)	567	21.2	2.6	12	37
Inclinazione groppa (p.ti)	567	5	1.3	2	9
Muscolosità anteriore (p.ti)	567	6.3	1.4	1	9
Muscolosità Posteriore (p.ti)	567	5.9	1.4	1	9
Profondità Mammaria (cm)	567	-1.4	11.2	-21	35
Lunghezza capezzoli anteriori (cm)	567	7.6	2.4	3	20
Body Condition Score (p.ti)	567	3.4	0.7	1	5


Incidenza dei difetti

CARATTERE	RILIEVI	Difetto Assente	Difetto Lieve	Difetto Marcato
Dorso Insellato	567	68.1	25.7	6.2
Dorso Arcuato	567	97.4	2.3	0.4
Spalle deboli	567	71.1	26.1	2.8
Garretti serrati	567	64.2	30.2	5.6
Unghia aperta	567	80.6	18.3	1.1
Capezzoli soprannumerari	567	61.9	24.9	13.2
Capezzoli a imbuto	567	61.0	31.4	7.6
Mammella spaccata	567	42.9	40.9	16.2
Capezzoli non perpendicolari	567	75.5	23.6	0.9
Piano inclinato mammella	567	47.1	44.1	8.8

Distribuzione dei soggetti in base a caratteristiche del mantello e delle corna



Distribuzione dei soggetti in base alle caratteristiche di temperamento



*Dati elaborato a cura del Prof. Roberto Mantovani
Department of Agronomy, Food, Natural Resources, Animal and Environment (DAFNAE)
Università di Padova - ITALIA*