

STATISTICHE DESCRITTIVE INERENTI I NUOVI FENOTIPI RILEVATI SUI TORELLI IN STAZIONE DI CONTROLLO DELLA RAZZA GRIGIO ALPINA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DUAL BREEDING

STATISTICA SUI RILIEVI DISPONIBILI – INCREMENTALE

DATI RELATIVI A 61 SOGGETTI RILEVATI A CIRCA 7 MESI DI ETÀ

Fenotipo	Media	Dev.St.	C.V.	Min.	Max.
Altezza al garrese	106.0	3.3	3.1%	98	113
Profondità toracia	49.4	2.4	4.9%	43	53
Larghezza torace	29.3	4.0	13.7%	23	40
Circonferenza toracica	136.5	6.2	4.5%	117	146
Lunghezza tronco	103.2	19.1	18.5%	60	126
Larghezza bis-iliaca	32.1	4.1	12.8%	26	43
Larghezza bis-ischiatica	10.4	4.1	39.4%	6	33
Larghezza bis-trocanteriana	36.1	2.9	8.0%	31	43
Lunghezza Groppa	37.0	3.3	8.9%	32	46
Circonferenza spirale coscia	133.9	9.1	6.8%	120	162
Perimetro orizzontale coscia	40.3	4.8	11.9%	16	50
Circonferenza stinco	16.5	1.2	7.3%	13	19
Circonferenza scrotale	21.4	3.1	14.5%	16	29.5
Spessore pelle	1.0	0.3	30.0%	0.5	1.6
Temperamento	2.5	0.5	20.0%	2	3
BCS	3.2	0.2	6.3%	2.75	3.75

DATI RELATIVI A 61 SOGGETTI RILEVATI A CIRCA 11 MESI DI ETÀ

Fenotipo	Media	Dev.St.	C.V.	Min.	Max.
Altezza al garrese	119.2	2.2	1.8%	115	125
Profondità toracia	60.2	2.7	4.5%	53	68
Larghezza torace	39.0	3.8	9.7%	26	45
Circonferenza toracica	171.0	6.0	3.5%	156	180
Lunghezza tronco	135.3	8.4	6.2%	113	148
Larghezza bis-iliaca	40.5	3.9	9.6%	32	48
Larghezza bis-ischiatica	12.3	1.6	13.0%	10	19
Larghezza bis-trocanteriana	44.5	2.6	5.8%	36	49
Lunghezza Groppa	44.3	2.3	5.2%	40	50
Circonferenza spirale coscia	159.6	8.0	5.0%	136	173
Perimetro orizzontale coscia	48.5	6.0	12.4%	20	55
Circonferenza stinco	19.4	1.1	5.7%	17	21
Circonferenza scrotale	30.6	2.5	8.2%	25	34
Spessore pelle	1.7	0.3	17.6%	1.0	2.2
Temperamento	2.8	0.5	17.9%	2	3
BCS	3.5	0.2	5.7%	3.00	3.75

*Dati elaborato a cura del Prof. Roberto Mantovani
Department of Agronomy, Food, Natural Resources, Animal and Environment (DAFNAE)
Università di Padova - ITALIA*