





STATISTICHE DESCRITTIVE INERENTI AI NUOVI FENOTIPI RILEVATI SULLE PRIMIPARE DELLA RAZZA GRIGIO ALPINA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PSRN AL 31/01/2023 – DATI TOTALI



Le statistiche descrittive che seguono sono relative a 6235 rilevamenti effettuati nella fase 1 e 2900 nella fase 2 del progetto Dualbreeding, per un totale di 9135 rilievi fenotipici totali.

Misure Zoometriche, BCS ed EUROP

Fenotipo	Rilievi	Media	Dev.st.	Min.	Max.	C.V.
Altezza al sacro	9135	134.0	3.7	117	148	2.7%
Circonferenza toracica	9135	186.7	6.5	132	218	3.5%
Circonferenza spirale coscia	9135	167.9	5.5	117	196	3.3%
Perimetro orizzontale coscia	9135	48.3	3.2	37	69	6.7%
Altezza tallone	9135	2.8	0.8	1	6	27.8%
BCS	9135	3.22	0.32	1.50	4.50	9.8%
EUROP	7875	96.8	6.0	76.7	113.3	6.2%

DISTRIBUZIONI DI FREQUENZA DEI NUOVI FENOTIPI – Misure Zoometriche, BCS ed EUROP












Caratteri Temperamentali, di pascolamento e tipicità soggetti


Fenotipo	Rilievi	Media	Dev.st.	Min.	Max.
Temperamento	9135	2.4	0.7	1	3
Presenza remolini	9135	2.9	1.0	0	6
Larghezza musello	9135	2.3	0.6	1	3
Qualità garretto	9135	2.1	0.7	1	3
Tipicità mantello	9135	3.6	1.2	1	6
Colore corna	9135	1.5	0.7	0	2
Concavità osso frontale	9135	2.0	0.6	1	3

DISTRIBUZIONI DI FREQUENZA DEI NUOVI FENOTIPI – Caratteri Temperamentali, di pascolamento e tipicità dei soggetti





DISTRIBUZIONI DI FREQUENZA DEL DIFETTO DI ATTACCO ALTO DELLA CODA



*Dati elaborati a cura del Prof. Roberto Mantovani
Department of Agronomy, Food, Natural Resources, Animal and Environment (DAFNAE)
Università di Padova - ITALIA*