Razza Pinzgauer

(1.350 rilievi totali: 792 rilievi in fase 1 e 558 in fase 2)

Tabella 1. Ripartizione dei soggetti relativamente ai caratteri di colore del mantello, distribuzione del mantello e portamento delle corna.

Colore mantello	N°	%	Mantello distrib.	N°	%	Corna	N°	%
Bianco	38	2.8%	Intero	21	1.6%	Assenti	583	43.2%
Grigio	0	0.0%	Pezzato	19	1.4%	Portate in alto	243	18.0%
Nero	6	0.4%	Spruzzato	15	1.1%	Portate in avanti	195	14.4%
Bruno Chiaro	2	0.1%	Striscia Dorsale	1295	95.9%	Rivolte in basso	38	2.8%
Bruno Scuro	5	0.4%				Decornato	291	21.9%
Castano	0	0.0%						
Fromentino	1	0.1%						
Rosso	33	2.4%						
Rosso Mogano	1265	93.7%						

Tabella 2. Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica.

Rilevamento	N°	Media	Ds	Min.	Max.
Altezza al sacro (cm)	1350	141.9	5.4	120	170
Profondità Addominale (cm)	1350	87.3	5.1	70	101
Lunghezza Tronco (cm)	1350	92.1	5.8	75	110
Lunghezza Groppa (cm)	1350	54.3	3.1	45	68
Larghezza Groppa Bis-iliaca (cm)	1350	55.4	3.8	44	70
Larghezza Groppa Bis-ischiatica (cm)	1350	20.9	4.2	13	40
Inclinazione Groppa (punti)	1350	4.8	1.2	1	9
Profondità Mammaria (cm)	1350	13.8	8.4	-20	35
Lunghezza Capezzoli Anteriori (cm)	1350	6.1	1.8	0	15
BCS (punti)	1350	3.3	0.5	1	5
Muscolosità Anteriore (punti)	1350	3.7	1.2	1	8
Muscolosità Posteriore (punti)	1350	4.2	1.2	1	8

Tabella 3. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti alla struttura degli animali.

Difetto	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Dorso Insellato	1177	87.2%	138	10.2%	35	2.6%
Dorso Arcuato	1238	91.7%	103	7.6%	9	0.7%
Spalle Deboli	1132	83.9%	172	12.7%	46	3.4%
Garretti serrati posteriormente	1182	87.6%	130	9.6%	38	2.8%
Unghia Aperta	1318	97.6%	28	2.1%	4	0.3%

Tabella 4. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti alla mammella.

Difetto	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Capezzoli a imbuto	1248	92.4%	82	6.1%	20	1.5%
Capezzoli non perpendicolari	1297	96.1%	43	3.2%	10	0.7%
Capezzoli Soprannumerari	1269	94.0%	65	4.8%	16	1.2%
Mammella spaccata tra i quarti	1241	91.9%	96	7.1%	13	1.0%
Piano inclinato	1230	91.1%	92	6.8%	28	2.1%

Tabella 5. Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento verso conspecifici, mungitura e operatori.

Temperamento	Non osservabile		Tranquillo		Nervoso	
	N°	%	N°	%	N°	%
Verso gli altri animali	1317	97.6%	31	2.3%	2	0.1%
Durante la mungitura	960	71.1%	316	23.4%	74	5.5%
Verso l'uomo	1310	97.0%	37	2.7%	3	0.2%

Dati elaborati a cura del Prof. Roberto Mantovani
Department of Agronomy, Food, Natural Resources, Animal and Environment (DAFNAE)
Università di Padova - ITALIA