

EREDITABILITÀ DEI FENOTIPI TRADIZIONALMENTE RILEVATI NELLA RAZZA PINZGAUER (PROGRAMMA DUALBREEDING-FASE 2 finale)

Dataset contenente 622 rilievi morfologici utili e 3448 animali nel pedigree.

CARATTERE	Varianza Genetica	Varianza Fenotipica	Ereditabilità
Angolatura garretti	0.107	0.915	0.117
Altezza tallone	0.019	0.655	0.029
Posizione capezzoli anteriori	0.375	0.770	0.487
Lunghezza Capezzoli	1.071	1.327	0.807
Posizione capezzoli posteriori	0.207	0.627	0.330
Diametro capezzoli	0.640	1.157	0.553
Mammella forza attacco ant.	0.575	1.042	0.552
Mammella lunghezza attacco ant.	0.636	1.420	0.448
Mammella legamento centrale	0.164	0.808	0.203
Mammella lunghezza attacco post.	0.386	1.008	0.383
Mammella profondità (cm)	0.331	1.157	0.286
Pastoie	0.201	0.838	0.240
Purezza mammella	0.009	0.429	0.021
Qualità garretti	0.272	1.143	0.238
Punteggio Finale	0.736	2.397	0.307
Mole	1.225	8.007	0.153
Muscolosità	0.559	4.367	0.128
Arti e Piedi	0.965	4.777	0.202
Mammella	4.056	6.945	0.584

*Dati elaborato a cura del Prof. Roberto Mantovani
Department of Agronomy, Food, Natural Resources, Animal and Environment (DAFNAE)
Università di Padova - ITALIA*