



EREDITABILITÀ DEI NUOVI FENOTIPI RILEVATI NELLA RAZZA PINZGAUER NELL'AMBITO DEL PSRN (PROGRAMMA DUALBREEDING-FASE 2 finale)

Dataset contenente 1206 rilievi utili e 4951 animali nel pedigree.

CARATTERE	Varianza Genetica	Varianza Fenotipica	Ereditabilità
Altezza al sacro	6.063	24.848	0.244
Profondità Addominale	4.31	20.821	0.207
Lunghezza Tronco	3.061	24.102	0.127
Lunghezza Groppa	0.243	6.943	0.035
Larghezza Groppa Bis-Iliaca	2.158	9.991	0.216
Larghezza Groppa Bis-Ischiatica	0.938	6.559	0.143
Inclinazione Groppa	0.213	1.449	0.147
Profondità Mammaria	12.803	39.034	0.328
Lunghezza Capezzoli Anteriori	1.101	2.867	0.384
BCS	3.568	24.272	0.147
Muscolosità Anteriore	0.294	1.032	0.285
Muscolosità Posteriore	0.258	1.024	0.252

*Dati elaborato a cura del Prof. Roberto Mantovani
Department of Agronomy, Food, Natural Resources, Animal and Environment (DAFNAE)
Università di Padova - ITALIA*