

EREDITABILITÀ DEI NUOVI FENOTIPI RILEVATI NELLA RAZZA PUSTERTALER SPRINZEN/BARÀ NELL'AMBITO DEL PSRN (PROGRAMMA DUALBREEDING-FASE 2 finale)

Dataset contenente 1142 rilievi utili e 3334 animali nel pedigree.

CARATTERE	Varianza Genetica	Varianza Fenotipica	Ereditabilità
Altezza al sacro	0.782	14.481	0.054
Profondità Addominale	1.221	15.654	0.078
Lunghezza Tronco	0.585	13.295	0.044
Lunghezza Groppa	0.325	5.702	0.057
Larghezza Groppa Bis-Iliaca	1.094	7.442	0.147
Larghezza Groppa Bis-Ischiatica	0.236	2.593	0.091
Inclinazione Groppa	0.010	0.769	0.013
Profondità Mammaria	3.647	22.937	0.159
Lunghezza Capezzoli Anteriori	0.260	3.824	0.068
BCS	0.012	0.185	0.065
Muscolosità Anteriore	0.051	0.699	0.073
Muscolosità Posteriore	0.069	0.697	0.099

*Dati elaborato a cura del Prof. Roberto Mantovani
Department of Agronomy, Food, Natural Resources, Animal and Environment (DAFNAE)
Università di Padova - ITALIA*